



Antecedentes psiquiátricos:

Datos personales

Nombre y Apellido:

H. Cl. N°:

Fecha de admisión:

Fecha del informe:

Principal motivo de consulta

Antecedentes de la enfermedad actual

Aparición: insidiosa, abrupta.

Intensidad: baja, creciente, alta.

Desencadenantes:

Atenuación:

Tratamientos anteriores por el motivo de consulta actual

- psiquiátrico
- psicológico
- médico

Enfermedad psiquiátrica/ somática previa

Tratamientos anteriores y actuales por otras patologías

Antecedentes personales pasados

Nacimiento e infancia

Niñez

Adolescencia

Edad adulta

Antecedentes sexuales

Rechazo e hipersensibilidad a drogas

Hábitos alimentarios

Consumo

tabaco

café - te

alcohol

drogas

Antecedentes familiares

Padres

Esposa

Hijos/as

Hermanos

Enfermedades familiares (abuelos en adelante)

Estado Mental

Aspecto general

Aseado y alineado, condecorado, sin asear y desaliñado.

Conducta motora

Alteraciones del período de elaboración: Abulia. Hipobulia. Hiperbulia. Impulso. Compulsión.

Alteraciones del período ejecutivo: apraxia, ecopraxia, amaneramiento, extravagancias, estereotipias, interceptación cinética, negativismo, obediencia automática, flexibilidad cérea, cataplexia.

Actitud durante la entrevista

Colaboradora, poco colaboradora, resistente a la entrevista, agresiva con el entrevistador.

Estado anímico

Hipertimia: placentera, displacentera, mixta. Hipotimia. Atimia. Tenacidad. Labilidad. Incontinencia.

Ambivalencia.

Perplejidad. Neotimia. Catatimia.

Afecto

Lenguaje

oral: disartria, dislalia, afasia, disfemia, disfonía, taquilalia, bradilalia, verbigeración, mutismo, musitación, monólogo, neologismo, jergafasia, ecolalia, estereotipia verbal.

escrito: disgrafía, agrafia, alexia.

mímico: hipermimia, hipomimia, amimia. Paramimia.

Trastornos perceptivos

Apercepción. Ilusión. Alucinación: auditiva. visual. olfatoria. gustativa. táctica pasiva o activa. cenestésica.

kinésica. Pseudoalucinaciones. Alucinación psíquica. Alucinosis. Verbomotoras. Hipnagógicas.

Extracampinas. Percepción delirante. eco o sonorización del pensamiento.

Contenido del pensamiento

Delirante: verosímil / inverosímil.

Placentera: megalómana, mística, erótica, palignóstica.

Desplacentera: hipocondríacas, melancólicas, de perjuicio, de persecución, de reivindicación, de celos.

Obsesiva: impulsiva. fóbica. pura: escrúpulos, recuerdos, obsesión especulativa.

Idea fija.

Imaginación:

aumento, disminución, fabulación, mentira.

Proceso del pensamiento

Asociación de ideas:

ritmo acelerado, retardado. Alteración de la coherencia.

Pensamiento:

aceleración, retardo, prolijidad o minuciosidad, perseverancia, interceptación, rigidez, estereotipia, verbigeración, disgregación, incoherencia, delirante, obsesivo.

Sensorio

Obnubilación: embotamiento, somnolencia, coma. Estrechamiento. Estado crepuscular. Orientación: autopsíquica, alopsíquica.

Memoria

amnesias: parcial, total: anterógrada, retrógrada, retroanterógrada. Hipomnesia. Hiperamnesia. Dismnesia.

Ya visto. Nunca visto. Ilusión de la memoria. Alucinación de la memoria. Criptomnesia. Ecmnesia.

Paramnesia reduplicadora.

Concentración y cálculo

Aprosexia. Hipoprosexia. Hiperprosexia. Paraprosexia.

Información e inteligencia

Juicio

Conservado, insuficiente, debilitado, suspendido, parcialmente desviado, totalmente desviado.

Nivel de insight

Excelente, bueno, regular, malo, sin conciencia de enfermedad.

Examen médico y neurológico

Diagnóstico multiaxial

Eje I: síndromes clínicos

Eje II: trastornos del desarrollo y la personalidad

Eje III: trastornos o enfermedades físicas

Eje IV: severidad de los factores de estrés psicosocial

0 información inadecuada o condición sin cambios

1 nulo

2 leve

3 moderado

4 severo

5 extremo

6 catastrófico

Eje V: evaluación global del funcionamiento

90 síntomas ausentes o mínimos

80 reacciones transitorias al stress

70 dificultades leves

60 dificultades moderadas

50 dificultades severas

40 leve a moderado deterioro del juicio

30 severo deterioro del juicio

20 peligrosidad episódica para sí mismo o para terceros

10 peligrosidad persistente para sí mismo o para terceros

Formulación psicodinámica

aislamiento / compensación / control consciente / conversión / desplazamiento / disociación / formación reactiva / identificación / introyección / negación / proyección / racionalización / regresión / reparación o restitución / represión / resistencia / simbolización / sublimación

Diagnóstico diferencial

Escala Pronóstica

- 0 información inadecuada o condición sin cambios
- 1 recuperación completa
- 2 recuperación parcial
- 3 cronicidad
- 4 deterioro progresivo lento
- 5 deterioro progresivo rápido
- 6 muerte

Plan terapéutico

Eje I: objetivos y procesamiento

Eje II: recursos psicoterapéuticos

Eje III: recursos psicofarmacológicos

Eje IV: grado de respuesta

- 0 información inadecuada o condición sin cambios
- 1 nula
- 2 leve
- 3 moderada
- 4 buena
- 5 excelente

Eje V: escala de evaluación global del funcionamiento

- 90 desaparición sintomática
- 80 reaparición sintomática al stress
- 70 persistencia sintomática leve
- 60 persistencia sintomática moderada
- 50 persistencia sintomática severa
- 40 resistencia leve a moderada
- 30 resistencia severa
- 20 deserción episódica
- 10 deserción persistente